

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Supositórios de Glicerina (F.P.) Infantil, 1100 mg, supositórios Glicerina

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém informação importante para si.

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

1. O que é Supositórios de Glicerina (F.P.) Infantil e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Supositórios de Glicerina (F.P.) Infantil
3. Como utilizar Supositórios de Glicerina (F.P.) Infantil
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Supositórios de Glicerina (F.P.) Infantil
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Supositórios de Glicerina (F.P.) Infantil e para que é utilizado

Supositórios de Glicerina (F.P.) Infantil pertence ao grupo farmacoterapêutico dos laxantes de contacto.

É um laxante utilizado para situações de obstipação comum.

2. O que precisa de saber antes de utilizar Supositórios de Glicerina (F.P.) Infantil

Não utilize Supositórios de Glicerina (F.P.) Infantil

- se tem alergia à substância ativa ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).
- em doentes com dor abdominal aguda, náuseas, vómitos ou outros sintomas de apendicite;
- em doentes com oclusão intestinal ou dores abdominais de etiologia não esclarecida.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de utilizar Supositórios de Glicerina (F.P.) Infantil.

O doente deve consultar o seu médico se persistir a obstipação ou se o laxante não produzir efeito.

Outros medicamentos e Supositórios de Glicerina (F.P.) Infantil

Não deve ser utilizado conjuntamente com outros laxantes.

Gravidez

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas

A condução e a utilização de máquinas perigosas não deve ser praticado enquanto o medicamento não tiver atuando.

Supositórios de Glicerina (F.P.) Infantil contém gelatina e água purificada

3. Como utilizar Supositórios de Glicerina (F.P.) Infantil

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro se tiver dúvidas.

Crianças com menos de 6 anos: A dose usual é de 1 supositório de glicerina (F.P.) Infantil por dia.

Crianças com mais de 6 anos: A dose usual é de 2 supositórios de glicerina (F.P.) Infantil por dia.

Só deve ser utilizado quando for necessário, de preferência antes de deitar ou de manhã ao levantar.

O seu uso não deve ser muito prolongado.

Se utilizar mais Supositórios de Glicerina (F.P.) Infantil do que deveria

Não tem sido referidos casos de sobredosagem.

4. Efeitos indesejáveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Os eventuais efeitos indesejáveis com este medicamento, por via rectal, são raras e discretas: mal estar retal, irritação, sensação de queimadura, dor local ou tenesmo e, mais raramente ainda, mucorreia ou hemorragia mínima, sendo referidas quase só em casos de aplicação muito repetida.

Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente ao INFARMED, I.P.:

Portugal

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>
(preferencialmente)

ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. Como conservar Supositórios de Glicerina (F.P.) Infantil

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no embalagem exterior após VAL. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Supositórios de Glicerina (F.P.) Infantil

- A substância ativa é glicerina
- Os outros excipientes são gelatina e água purificada

Qual o aspeto de Supositórios de Glicerina (F.P.) Infantil e conteúdo da embalagem

Os Supositórios de Glicerina (F.P.) Infantil apresentam-se em caixas contendo 12 supositórios em fitas contentoras (2 fitas contentoras com 6 supositórios cada).

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

CPCH - Companhia Portuguesa Consumer Health, Lda.
Avenida António Augusto de Aguiar, nº108, 8º
1050-019 Lisboa
Portugal
Tel: 214449630
Fax: 214449634
cpch@cpch.pt

Labialfarma – Laboratório de Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, S.A.
Edifício Labialfarma, nº 1 Felgueira, Sobral
3450-336 Mortágua
Portugal

Este folheto foi revisto pela última vez em