

## FOLHETO INFORMATIVO

### FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

#### GASTROCYNESINE, comprimidos

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.  
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário tomar GASTROCYNESINE, comprimidos com precaução para obter os devidos resultados.

Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.

Caso precise de esclarecimentos e conselhos, consulte o seu farmacêutico.

Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é GASTROCYNESINE, comprimidos e para que é utilizado
2. Antes de tomar GASTROCYNESINE, comprimidos
3. Como tomar GASTROCYNESINE, comprimidos
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar GASTROCYNESINE, comprimidos
6. Outras informações

#### 1. O QUE É GASTROCYNESINE, comprimidos E PARA QUE É UTILIZADO

Medicamento homeopático tradicionalmente indicado em indisposição após as refeições: ardência, peso gástrico, sonolência, regurgitações.

#### 2. Antes de tomar GASTROCYNESINE, comprimidos

Não tome GASTROCYNESINE, comprimidos

Se tem alergia às substâncias ativas ou qualquer outro componente de GASTROCYNESINE, comprimidos

Tome especial cuidado com GASTROCYNESINE, comprimidos

Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

Tomar GASTROCYNESINE, comprimidos com outros medicamentos

Informe o seu médico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico antes de tomar qualquer medicamento.

Informações importantes sobre alguns componentes de GASTROCYNESINE, comprimidos

Excipientes de efeito notório: sacarose, lactose

### 3. COMO TOMAR GASTROCYNESINE, comprimidos

Via oral.

Adultos e crianças:

1 a 2 comprimidos, um quarto de hora antes das refeições. Se necessário, repita a administração após as refeições.

Deixe os comprimidos dissolverem-se lentamente na boca.

Para crianças com menos de um ano: esmague o comprimido e dissolva-o em água antes de administrar.

Se tomar mais GASTROCYNESINE, comprimidos do que deveria  
Consulte o seu médico ou farmacêutico para obter conselhos.

Caso se tenha esquecido de tomar GASTROCYNESINE, comprimidos  
Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar.

Se parar de tomar GASTROCYNESINE, comprimidos  
Caso tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

### 4. EFEITOS INDESEJÁVEIS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, GASTROCYNESINE, comprimidos pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

### 5. COMO CONSERVAR GASTROCYNESINE, comprimidos

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize GASTROCYNESINE, comprimidos após o prazo de validade impresso na caixa.

O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

### 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de GASTROCYNESINE, comprimidos

Para um comprimido de 300 mg:

APROVADO EM 26-10-2012 INFARMED
---------------------------------------

ABIES NIGRA 4 CH  
CARBO VEGETABILIS 4 CH  
NUX VOMICA 4 CH  
ROBINIA PSEUDO ACACIA 4 CH  
em partes iguais.

Os outros componentes são: sacarose, lactose, estearato de magnésio.

Qual o aspeto de GASTROCYNESINE, comprimidos e conteúdo da embalagem exterior

Comprimido de 300 mg.  
Caixa com 60 comprimidos.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado  
BOIRON  
20, rue de la Libération  
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon  
França

Fabricante  
BOIRON  
2, avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 Messimy  
França

Este folheto foi aprovado pela última vez em MM/AAAA