

## FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Aero-OM 125 mg cápsula mole  
simeticone

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.  
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto é necessário utilizar Aero-OM 125 mg com precaução para obter os devidos resultados.  
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.  
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos consulte o seu farmacêutico.  
Em caso de persistência ou agravamento dos sintomas consulte o seu médico.  
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto informe o seu médico ou farmacêutico

Neste folheto:

O que é Aero-OM 125mg, e para que é utilizado  
Antes de tomar Aero-OM 125 mg  
Como tomar Aero-OM 125 mg  
Efeitos secundários possíveis  
Como conservar Aero-OM 125 mg  
Outras informações

### 1. O que é Aero-OM 125 mg, e para que é utilizado

Aero-OM é um antiflatulento que actua reduzindo os gases que se acumulam no estômago e no intestino.

Qualquer que seja a sua proveniência, a retenção de gases no tracto gastrointestinal faz-se sob a forma de bolhas gasosas que podem causar distensão abdominal e dores.

O simeticone modifica a tensão superficial das bolhas gasosas e reduz a flatulência.

### 2. Antes de tomar Aero-OM 125 mg

Não utilize Aero-OM 125 mg:

Se tem hipersensibilidade (alergia) ao simeticone ou a qualquer outro ingrediente de Aero-OM 125 mg.

Em casos suspeitos ou conhecidos de perfuração ou obstrução intestinal.

Tomar Aero-OM 125 mg com outros medicamentos:

Informe o seu farmacêutico se está a tomar, ou tomou recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Gravidez e Aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas:

Sem efeito.

### 3. Como tomar Aero-OM 125 mg,

Adultos e crianças com idade superior a 15 anos: 1 cápsula mole 4 vezes por dia, após as refeições.

As cápsulas moles devem ser engolidas inteiras e não mastigadas.

Não devem ser ingeridos mais de 500 mg (4 cápsulas) por dia.

Tome sempre o Aero-OM de acordo com as instruções do seu farmacêutico. Se tiver dúvidas esclareça-as com o seu farmacêutico.

Se tiver a sensação de que o efeito do Aero-OM é muito forte ou muito fraco, fale com o seu farmacêutico.

Caso se tenha esquecido de tomar Aero-OM:

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Consulte o seu farmacêutico sobre o que fazer.

Se parar de tomar Aero-OM

Não existem efeitos da interrupção do tratamento com Aero-OM.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

### 4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, Aero-OM pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Estão descritos, embora que pouco frequentes:

- hipersensibilidade cutânea
- diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal

Em caso de aparecimento de um ou vários destes sintomas consulte o seu farmacêutico sobre o que fazer. Nunca pare o tratamento sem perguntar primeiro ao seu farmacêutico.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu farmacêutico.

Comunique ao seu médico ou farmacêutico efeitos secundários detectados não constantes deste folheto.

### 5. Conservação de Aero-OM 125 mg

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não conservar acima de 25° C.

Não usar Aero-OM após o prazo de validade indicado na embalagem após VAL\*. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não utilize se verificar deterioração do blíster.

APROVADO EM 14-12-2008 INFARMED
---------------------------------------

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente

## 6. Outras informações

A substância activa do Aero-OM, é o simeticone. Cada cápsula mole contem 125mg de simeticone.

Os outros ingredientes são solução de anidrisorb, glicerol, gelatina e amarelo de quinolina (E 104).

Embalagens de 20 ou 60 cápsulas moles.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e fabricante:

Titular da Autorização de Introdução no Mercado:

OM Pharma, S.A.  
R. da Indústria, 2 - Quinta Grande  
2610 - 088 Amadora - Lisboa  
Portugal

Fabricante:

R.P. Scherer GmbH & Co. KG  
Gammelbacher Strasse, 2 Eberbach - Baden  
Alemanha

e

OM Pharma, S.A.  
R. da Indústria, 2 - Quinta Grande  
2610 - 088 Amadora - Lisboa  
Portugal

Este folheto foi aprovado pela última vez em