

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Aciclovir Generis 50 mg/g Creme
Aciclovir

Leia atentamente com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém informação importante para si.

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Se não se sentir melhor ou piorar após 10 dias, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

1. O que é Aciclovir Generis e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Aciclovir Generis
3. Como utilizar Aciclovir Generis
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Aciclovir Generis
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Aciclovir Generis e para que é utilizado

Aciclovir Generis pertence a um grupo de medicamentos conhecidos como antivirais (medicamentos utilizados para as infeções provocadas por vírus).

Este medicamento é utilizado para ajudar a cicatrizar as lesões nos lábios provocadas pelo vírus Herpes simplex, mais conhecido como herpes labial.

2. O que precisa de saber antes de utilizar Aciclovir Generis

Antes de utilizar este medicamento é importante que leia esta secção e esclareça quaisquer dúvidas que possa ter com o seu médico ou farmacêutico.

Não utilize Aciclovir Generis

Este medicamento está contraindicado nas seguintes situações:

- se tem alergia ao aciclovir, substância ativa deste medicamento, ao álcool cetostearílico, ao propilenoglicol (E1520) ou a qualquer outro componente de Aciclovir Generis (os outros componentes do medicamento estão indicados na secção 6).
- se tem alergia ao valaciclovir, substância ativa semelhante ao aciclovir
- se as lesões se encontram na cavidade oral, olhos ou mucosa vaginal

Não utilize este medicamento se alguma das situações referidas se aplica a si. Se não tem a certeza fale primeiro com o seu médico antes de iniciar o tratamento.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Aciclovir Generis:

- se está gravemente imunocomprometido (quando o seu sistema imunitário não funciona normalmente apresentando um risco maior de contrair infeções ou determinadas doenças).

Evite o contacto deste medicamento com os olhos.

Crianças

Não se recomenda a utilização de Aciclovir Generis em crianças com menos de 2 anos de idade.

Outros medicamentos e Aciclovir Generis

Informe o seu médico se está a utilizar, utilizou recentemente, ou vier a utilizar outros medicamentos.

Gravidez e amamentação

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar este medicamento.

Não deve utilizar Aciclovir Generis durante a gravidez e amamentação sem falar primeiro com o seu médico.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Pode conduzir veículos ou utilizar máquinas durante o tratamento com este medicamento.

Aciclovir Generis contém álcool cetostearílico e propilenoglicol (E1520)

O álcool cetostearílico pode causar reações cutâneas locais (por exemplo dermatite de contacto).

O propilenoglicol (E1520) pode causar irritação cutânea.

3. Como utilizar Aciclovir Generis

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Instruções de utilização

1. Lave bem as mãos antes de cada aplicação.
2. Aplique a quantidade suficiente para cobrir a área afetada.
3. Não coce as lesões com as mãos ou com uma toalha, para evitar possíveis contágios.
4. Lave bem as mãos após cada aplicação.

Adultos, adolescentes e crianças com mais de 2 anos

Aplique 5 vezes por dia, de 4 em 4 horas, omitindo a aplicação da noite.

Deve aplicar o creme nas lesões após o início de uma infeção e o mais cedo possível.

Duração do tratamento

Deve aplicar este medicamento durante 4 dias seguidos. Se após estes 4 dias a lesão não tiver cicatrizado pode continuar o tratamento por mais 6 dias seguidos. Se após estes 10 dias ainda continuar com a lesão deve consultar o seu médico.

Se utilizar mais Aciclovir Generis do que deveria

Não é de esperar uma situação de sobredosagem uma vez que este medicamento se destina a aplicação tópica.

Se ingerir acidentalmente Aciclovir Generis, ou se outra pessoa ou criança ingerir o seu medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Caso se tenha esquecido de utilizar Aciclovir Generis

Não aplique uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de aplicar.

Se se esqueceu de aplicar uma dose, aplique-a assim que se lembrar e depois retome o intervalo habitual entre as doses.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Em casos muito raros este medicamento pode provocar:

- inchaço da face, olhos, lábios, boca, língua ou garganta
- dificuldades respiratórias
- urticária.

Se tal ocorrer PARE de utilizar este medicamento e consulte o seu médico.

Efeitos secundários pouco frequentes (podem ocorrer até 1 em cada 100 pessoas):

- ardor transitório
- sensação de picadas após aplicação
- secura ligeira da pele
- descamação da pele
- comichão.

Efeitos secundários raros (podem ocorrer até 1 em cada 1 000 pessoas):

- eritema (vermelhidão).
- dermatite de contacto (inflamação da pele).

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

5. Como conservar Aciclovir Generis

O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior após "VAL.". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Aciclovir Generis

- A substância ativa é o aciclovir. Um grama de creme contém 50 mg de aciclovir.
- Os outros componentes são: poloxamero 407, álcool cetostearílico, laurilsulfato de sódio, parafina líquida, vaselina branca, propilenoglicol (E1520) e água purificada.

Qual o aspeto de Aciclovir Generis e conteúdo da embalagem

Aciclovir Generis apresenta-se na forma de creme para uso cutâneo.

Aciclovir Generis é embalado em bisnaga de alumínio contendo 2 g, 5 g ou 10 g de creme.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Generis Farmacêutica, S.A.

Rua João de Deus, 19

2700-487 Amadora

Portugal

Fabricante

Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A.

Rua do Padrão, nº 98

3000-312 Coimbra

Portugal

Este folheto foi revisto pela última vez em