

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Momendol 100 mg/g (10%) gel
Naproxeno

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.

- Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar Momendol com precaução para obter os devidos resultados.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas após 7 dias, consulte o seu médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é Momendol e para que é utilizado
2. Antes de utilizar Momendol
3. Como utilizar Momendol
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Momendol
6. Outras informações

1. O QUE É Momendol E PARA QUE É UTILIZADO

Momendol pertence à classe de medicamentos analgésicos anti-inflamatórios não esteróides para uso tópico.

Momendol é usado localmente para tratar dores musculares e articulares como: dor muscular (mialgia), dor lombar, rigidez do pescoço, inflamação da bolsa sinovial junto à articulação ou tendão (bursite), inflamação do tendões (tendinite), inflamação de membrana sinovial dos tendões (tenossinovite), inflamação da articulação (periartrite), entorses, rupturas musculares, contusões e hematoma.

Momendol pode ser usado como adjuvante na reabilitação em consequência de trauma e/ou cirurgia ortopédica.

2. ANTES DE UTILIZAR Momendol

Não utilize Momendol

Se tem alergia (hipersensibilidade) à substância activa, a qualquer dos excipientes ou a outras substâncias químicas relacionadas.

Se tem doenças alérgicas como asma, urticária, rinite, polipos nasais, angioedema e reacções anafilácticas após a toma de medicamentos contendo ácido acetilsalicílico e/ou outros anti-inflamatórios não esteróides.

O produto não pode ser aplicado nos olhos, membranas mucosas, feridas e/ou lesões cutâneas.

Momendol No terceiro trimestre de gravidez (ver “Gravidez e aleitamento”)

Tome especial cuidado com Momendol

De modo a prevenir quaisquer eventos de hipersensibilidade ou fotossensibilidade, evite a exposição directa à luz solar, incluindo solários, camas ou lâmpadas de bronzamento durante o tratamento ou nas duas semanas seguintes (ver também a secção “Efeitos secundários possíveis”).

O uso do produto deve ser descontinuado se os doentes apresentarem erupção ou irritação cutânea.

Se estiver a tomar/utilizar outros medicamentos que requeiram precaução, ver a secção seguinte “Utilizar Momendol com outros medicamentos”.

Ao utilizar Momendol com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Ao utilizar Momendol com alimentos e bebidas

Não aplicável.

Gravidez e aleitamento

Não pode ser excluída a ocorrência de efeitos nocivos no feto e/ou criança. Assim, o uso de Momendol durante a gravidez e/ou aleitamento deve ocorrer sob recomendação médica e quando estritamente necessário.

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar quaisquer medicamentos.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Normalmente, o uso de Momendol não altera a capacidade de condução e utilização de máquinas.

3. COMO UTILIZAR Momendol

Espalhe Momendol na área dorida, duas vezes por dia, massajando ligeiramente até completa absorção.

Momendol não está recomendado para utilização em crianças com idade inferior a 12 anos devido a ausência de dados de segurança e eficácia nas crianças.

Não utilize durante mais de 7 dias. Não exceda as doses recomendadas.

Se a dor persistir ou piorar, consulte o médico.

Se utilizar mais Momendol do que deveria

Não foram reportados casos de sobredosagem devido ao uso de Momendol.

Se utilizou Momendol mais vezes que o recomendado ou em caso de ingestão acidental, contacte o seu médico ou farmacêutico.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como acontece com todos os medicamentos, Momendol pode causar efeitos secundários, no entanto, estes não se manifestam em todas as pessoas.

Com alguns anti-inflamatórios não esteróides para uso tópico, foram observadas reacções cutâneas como vermelhidão da pele (eritema), comichão (prurido), irritação na pele, sensação de calor ou queimadura na área de aplicação do gel (dermatite de contacto). Foram observados alguns casos de formação de bolhas de líquido (erupção bulhosa) de gravidade variável.

É possível a ocorrência de reacções de fotossensibilidade após a exposição directa à luz solar (consulte também a secção “Tome especial cuidado com Momendol”).

O uso prolongado de produtos para administração tópica pode causar fenómenos de hipersensibilidade. Neste caso, suspenda o tratamento, consulte o seu médico e conte-lhe o ocorrido.

Se algum dos efeitos secundários se agravar, ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR Momendol

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize Momendol após o prazo de validade impresso no rótulo e na embalagem exterior a após a abreviatura utilizada para prazo de validade (“Val”).

O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

O medicamento não necessita de qualquer temperatura especial de conservação.

Conserve na embalagem de origem com a tampa fechada, para proteger da luz e da evaporação.

Não utilize Momendol se verificar sinais visíveis de deterioração.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.

Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita.

Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Momendol

A substância activa é naproxeno na concentração de 10% p/p (1 g de produto contém 100 mg de naproxeno).

Os outros componentes são:

Álcool isopropílico,
Trolamina,
Glicerol,
Hidroxietilcelulose,
Hidróxido de sódio,
Aroma de mentol e eucaliptol,
Água purificada.

Qual o aspecto de Momendol e conteúdo da embalagem

Momendol apresenta-se sob a forma de um gel transparente, homogéneo, incolor a ligeiramente amarelo, de aroma adocicado.

Cada embalagem contém um bisnaga de gel de 50 ou 100 g.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Angelini Farmacêutica, Lda
Rua João Chagas, 53 – Piso 3
1499-040 Cruz Quebrada-Dafundo
Portugal
Tel: 21 414 83 00
Fax: 21 414 29 81

Fabricante

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.
Via Vecchia del Pinocchio, 22
60131 Ancona
Itália
Tel: 0039 071 8091
Fax: 0039 071 809440

Este folheto foi aprovado pela última vez em: