

Folheto Informativo: Informação para o Utilizador

Strepsils Mentol e Eucalipto 1,2 mg + 0,6 mg

Pastilhas

Álcool 2,4 - diclorobenzílico + Amilmetacresol

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 3 dias, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

1. O que é Strepsils Mentol e Eucalipto e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Strepsils Mentol e Eucalipto
3. Como tomar Strepsils Mentol e Eucalipto
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Strepsils Mentol e Eucalipto
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Strepsils Mentol e Eucalipto e para que é utilizado

Strepsils Mentol e Eucalipto contém dois antissépticos utilizados em medicamentos para a garganta. Estas substâncias são antissépticos ligeiros, que eliminam as bactérias associadas a infeções da boca e garganta.

A dissolução da pastilha na boca permite que as substâncias ativas atuem na zona afetada e também ajuda a lubrificar e suavizar a zona dolorosa. Esta ação ajuda a aliviar a dor e o desconforto das infeções da boca e garganta e a tosse seca e irritativa associada a constipações e congestão nasal.

2. O que precisa de saber antes de tomar Strepsils Mentol e Eucalipto

Este medicamento é recomendado para adultos, crianças (com mais de 6 anos de idade) e idosos. Este medicamento não deve ser tomado por crianças com idade inferior a 6 anos.

Não utilize Strepsils Mentol e Eucalipto

- se tem alergia ao amilmetacresol, ao álcool diclorobenzílico ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).

- se tem intolerância a alguns açúcares tais como frutose, glucose-galactose e sacarose-isomaltose. Estas situações de intolerância serão habitualmente confirmadas pelo seu médico. A intolerância pode resultar de doenças como a deficiência da enzima frutose-1-fosfato aldolase (responsável pela intolerância à frutose), malabsorção de glucose-galactose e insuficiência de sacarase-isomaltase.
- se é diabético (Diabetes Mellitus).

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Strepsils Mentol e Eucalipto:

- se tem ou teve recentemente outros problemas de garganta.

Outros medicamentos e Strepsils Mentol e Eucalipto

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Strepsils Mentol e Eucalipto com alimentos, bebidas e álcool

Não aplicável.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Este medicamento não deve afetar a capacidade para conduzir e utilizar máquinas.

Strepsils Mentol e Eucalipto contém glucose e sacarose

Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

3. Como tomar Strepsils Mentol e Eucalipto

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

A dose recomendada é:

Adultos e crianças com 6 anos ou mais: uma pastilha cada 2-3 horas deixando-a dissolver lentamente na boca. Até um máximo de 12 pastilhas em 24 horas.

Não utilizar este medicamento em crianças com menos de 6 anos de idade.

Não tome este medicamento durante mais de 3 dias, exceto se o seu médico o recomendar. Se os sintomas não melhorarem ou se se agravarem, ou se surgirem novos sintomas, deverá consultar o seu médico ou farmacêutico.

Se tomar mais Strepsils Mentol e Eucalipto do que deveria
Poderá sentir algum desconforto gastrointestinal. Pare de tomar o medicamento e consulte o médico ou farmacêutico.
Não exceder a dose recomendada.

Caso se tenha esquecido de tomar Strepsils Mentol e Eucalipto
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma pastilha que se esqueceu de tomar.
Continue a tomar o medicamento normalmente.

Se parar de tomar Strepsils Mentol e Eucalipto
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

PARE DE TOMAR este medicamento e contacte imediatamente um médico se desenvolver:

- alguma reação de hipersensibilidade a este medicamento, como comichão.

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente através do sistema nacional de notificação mencionado abaixo:

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

Fax: + 351 21 798 73 97

Sítio da internet: <http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage>

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. Como conservar Strepsils Mentol e Eucalipto

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem, a seguir a “VAL”. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não conservar acima de 25°C.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Strepsils Mentol e Eucalipto

- As substâncias ativas são álcool 2,4-diclorobenzílico (1,2 mg) e amilmetacresol (0,6 mg)
- Os outros componentes são: óleo essencial de eucalipto, levomentol, carmim de indigo (E132), ácido tartárico, sacarose líquida, glucose líquida.

Qual o aspeto de Strepsils Mentol e Eucalipto e conteúdo da embalagem

Pastilhas azuis com um sabor característico a mentol e eucalipto e com o ícone da marca Strepsils gravada em ambas as faces.

Embalagens com blisters de 8, 16, 24 e 36 pastilhas.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Reckitt Benckiser Healthcare, Lda.

Rua D. Cristóvão da Gama, n.º 1 – 1º C/D

1400-113 Lisboa

Portugal

Fabricante

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd

Thane Road, Nottingham, NG90 2DB

Reino Unido

Este folheto foi revisto pela última vez