

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Venoparil Gel

Escina + Salicilato de dietilamina

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente. Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar VENOPARIL GEL com precaução para obter os devidos resultados. Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler. Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico. Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico. Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é VENOPARIL GEL e para que é utilizado
2. Antes de utilizar VENOPARIL GEL
3. Como utilizar VENOPARIL GEL
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar VENOPARIL GEL
6. Outras informações

1. O QUE É VENOPARIL GEL E PARA QUE É UTILIZADO

As substâncias activas de VENOPARIL GEL são Escina e Salicilato de dietilamina. 100 g de gel contêm: 1g de Escina e 5 g de Salicilato de dietilamina.

VENOPARIL GEL pertence ao grupo farmacoterapêutico: 3.6 Venotrópicos.

VENOPARIL GEL é utilizado no alívio sintomático da dor associada a lesões nos tecidos musculares superficiais, designadamente lesões ocorridas na prática de desportos. Tratamento das manifestações funcionais das insuficiências venosas crónica e aguda.

2. ANTES DE UTILIZAR VENOPARIL GEL

Não utilize VENOPARIL GEL

- Sobre a pele ferida, em mucosas, ou áreas de pele previamente expostas a radiação.
- Se tem alergia (hipersensibilidade) à Escina ou ao Salicilato de dietilamina ou a qualquer outro componente de VENOPARIL GEL.

Tome especial cuidado com VENOPARIL GEL

- Deve aplicar VENOPARIL GEL apenas sobre a pele íntegra.
- Em presença de soluções de continuidade da pele, recomenda-se que aplique o VENOPARIL GEL na área circundante.

Nestes casos deve consultar o médico que avaliará a sua situação clínica.

Ao Utilizar VENOPARIL GEL com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Não se conhecem interações medicamentosas com significado clínico.

Ao Utilizar VENOPARIL GEL com alimentos e bebidas
Não aplicável.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
Pode ser um produto de administração tópica, e estar demonstrado que a sua absorção sistémica é praticamente nula, pode considerar-se segura a utilização de VENOPARIL GEL nestas situações.

Condução de veículos e utilização de máquinas
Não aplicável.

Informações importantes sobre alguns componentes de VENOPARIL GEL
Não aplicável.

3. COMO UTILIZAR VENOPARIL GEL

Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Espalhar uma fina camada de VENOPARIL GEL sobre a região de pele afectada, uma ou várias vezes ao dia.

Modo e via de administração:

VENOPARIL GEL destina-se exclusivamente ao uso cutâneo.

Não é necessário friccionar o gel na área a tratar, não existindo inconveniente em o fazer se desejável.

Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver a impressão de que VENOPARIL GEL é demasiado forte ou demasiado fraco.

A posologia recomendada aplica-se a adultos de todas as idades incluindo idosos.

Não foram efectuados estudos clínicos em crianças.

Não existem informações sobre os efeitos do VENOPARIL GEL em doentes com patologias especiais.

Duração do tratamento médio:

Não está estabelecido o limite para a duração do tratamento. No entanto, o tratamento deve ser continuado até ao desaparecimento dos sintomas.

Se utilizar mais VENOPARIL GEL do que deveria

Não foram descritas, até ao momento, ocorrências de sobredosagem ou intoxicação com VENOPARIL GEL.

Caso se tenha esquecido de utilizar VENOPARIL GEL

Não aplicável.

Se parar de utilizar VENOPARIL GEL

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, VENOPARIL GEL pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Poderão ocorrer, embora raramente, reacções cutâneas de hipersensibilidade (eczema de contacto, ou sintomas associados, como por exemplo, eritema, prurido, vesiculação).

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR VENOPARIL GEL

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não existem instruções especiais de conservação.

Não utilize VENOPARIL GEL após o prazo de validade impresso na embalagem, após "EXP". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de VENOPARIL GEL

- As substâncias activas são Escina e Salicilato de dietilamina
- Os outros componentes são Essência de lavanda, essência de flor de laranjeira, ácido poliacrílico, Softigen 767, EDTA sódico, trometamol, isopropanol, água purificada.

Qual o aspecto de VENOPARIL GEL e conteúdo da embalagem

VENOPARIL GEL está disponível em embalagens com uma bisnaga de 40 g ou de 100 g de gel.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

BGP Products, Unipessoal Lda.
Av. D. João II, Edifício Atlantis, N.º 44C - 7.3 e 7.4
1990-095 Lisboa

Fabricante: MADAUS GmbH.51101 Cologne. Alemanha.

Este folheto foi aprovado pela última vez em {MM/AAAA}