

Folheto Informativo

Nome do Medicamento

Rosalgin, cloridrato de benzidamina

Composição Qualitativa e Quantitativa

Cada saqueta contém:

Cloridrato de Benzidamina 500 mg

Forma Farmacêutica

Pó para solução vaginal

Categoria Farmaco-Terapêutica

Grupo VIII-1-b Fórmulas de Aplicação Tópica na Vagina, Anti-infecciosos e anti-sépticos ginecológicos.

Nome ou Designação do Responsável pela A.I.M.

Angelini Pharma Portugal, Unipessoal Lda
Rua João Chagas, n° 53 – 3° Piso
1499-040 Cruz Quebrada - Dafundo

Indicações Terapêuticas

Vulvovaginites e cervicites de etiologia diversa, incluindo as de origem química e de radioterapia
Profilaxia pré e post operatória na cirurgia ginecológica
Higiene íntima durante o puerpério

Contra-Indicações e Efeitos Secundários

Rosalgin, não deve ser utilizado em utentes, que tenham apresentado hipersensibilidade aos componentes do medicamento, ou com substâncias quimicamente relacionadas.

Não foram reportados efeitos secundários, devido ao uso do Rosalgin pó para solução vaginal.

Interacções Medicamentosas e Outras

Não foram reportadas interacções com outros fármacos vulgarmente utilizados.

Precauções Especiais de Utilização

O uso prolongado de produtos de aplicação tópica, pode originar fenómenos de sensibilização.

Nestes casos, deverá interromper o tratamento e adoptar as medidas terapêuticas adequadas.

Se num período breve de tratamento, não obtiver resultados apreciáveis, deverá consultar o médico.

Efeitos em Grávidas, Lactentes, Crianças, Idosos e Doentes com Patologias Especiais

Não existe contra-indicação, ao uso tópico da benzidamina, na gravidez e durante o aleitamento.

Efeitos sobre a Capacidade de Condução e Utilização de Máquinas

Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

Lista dos Excipientes

Cloreto de Sódio, Tricetol e Polivinilpirrolidona

Posologia Usual, com Referência à Dose Máxima

Dissolver o conteúdo de uma ou duas saquetas num litro de água. Utilizar para lavagens vaginais, 1 ou 2 vezes ao dia, segundo o parecer do médico.

Indicação do Momento Mais Favorável à Administração do Medicamento

Aquando do aparecimento da sintomatologia

Duração do Tratamento Médio, quando deva ser limitado

A duração do tratamento, depende da situação clínica e da sua evolução.

Indicação de como suspender o tratamento se a sua suspensão causar efeitos de privação

Se for omitida a administração de uma ou mais doses, o tratamento deve continuar.

Não é necessária qualquer precaução especial, para a suspensão do tratamento.

Se utilizar mais Rosalgin do que deveria

Se ingerir acidentalmente um pouco do seu medicamento, contacte imediatamente o seu médico ou farmacêutico.

Aconselhamento ao Utente

Deverá consultar o médico se a afecção se manifestar repetidamente, ou se tiver notado qualquer alteração recente, nas suas características.

Se verificar algum efeito secundário que não conste neste folheto , deverá comunicá-lo ao seu médico ou ao farmacêutico.

Verifique se o produto se encontra dentro do prazo de validade inscrito na embalagem.

Mantenha sempre os medicamentos fora do alcance das crianças.

Precauções Particulares de Conservação e Indicação de Sinais Visíveis de Deterioração, se Existirem

Não é necessária qualquer precaução especial para a conservação do produto. Não guardar acima de 25°C

Data da Última Revisão do Folheto

APROVADO EM
17-07-2020
INFARMED