

FOLHETO INFORMATIVO

DYNERGUM 2000 mg/10 ml Solução oral
Malato de Citrulina

COMPOSIÇÃO

Substância Activa

Solução a 50% de Malato de Citrulina.....2,0 g

Outros Componentes

Aroma natural de Laranja "sangria orange", solução concentrada de hidróxido de sódio, água purificada.....para uma ampola.

FORMA FARMACÊUTICA

Solução oral.

APRESENTAÇÃO

Caixa com 18 ampolas bebíveis auto-quebráveis com 10 ml de solução oral.

GRUPO FÁRMACO-TERAPÊUTICO

11 Nutrição

TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Laboratórios BIOCDEX
19 rue Barbés
92120 Montrouge - FRANÇA

DESCRIÇÃO

Antiasténico: Suplemento de aminoácidos.

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

Este medicamento está indicado no tratamento de estados de astenia de causa identificada.

Devido à ausência de açúcar, o DYNERGUM pode ser usado por diabéticos.

CONTRA-INDICAÇÕES

Hipersesibilidade conhecida a qualquer um dos componentes.

EFEITOS INDESEJÁVEIS

Devido ao DYNERGUM apresentar um pH ácido, podem ocorrer no início do tratamento alguns casos de dor gástrica que contudo desaparece com a continuação do mesmo.

INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS

Nenhumas.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO

Uma ampola de DYNERGUM contém em média 30 mg de sódio para ajustamento do pH e isso deve ser tomado em conta para doentes submetidos a uma dieta sem sal.

Devido ao pH ácido, o conteúdo das ampolas deve ser diluído num copo com água ou com uma bebida açucarada e preferencialmente tomada às refeições.

EFEITOS EM GRÁVIDAS, LACTENTES, CRIANÇAS, IDOSOS E DOENTES COM PATOLOGIAS ESPECIAIS

Até esta data não existem relatórios clínicos a cerca de qualquer efeito fetotóxico ou malformações. Contudo, a monitorização de gravidezes expostas a este medicamento é insuficiente para garantir a ausência de qualquer risco. Por esta razão e como medida de precaução, este medicamento não deve ser usado durante a gravidez.

Na ausência de dados sobre a excreção deste medicamento pelo leite materno, o seu uso deve ser desaconselhado nas mães que amamentam.

EFEITOS SOBRE A CAPACIDADE DE CONDUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS

Não foram verificados efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

EXCIPIENTES CUJO CONHECIMENTO É NECESSÁRIO PARA A CONVENIENTE UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO

Não aplicável.

POSOLOGIA, MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO

Tal como para todos os medicamentos antiasténicos, a duração do tratamento deve ser limitada de acordo com as recomendações do seu médico assistente.

A posologia é:

- adultos e idosos: 3 ampolas por dia.
- crianças: 2 ampolas por dia.

O DYNERGUM é para ser tomado à hora das refeições, num copo com água ou com uma bebida açucarada.

INDICAÇÃO DO MOMENTO MAIS FAVORÁVEL À ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO

À hora das refeições.

DURAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDIO

De acordo com a recomendação expressa do seu médico assistente.

INSTRUÇÕES SOBRE A ATITUDE A TOMAR QUANDO FOR OMITIDA UMA OU MAIS DOSES

Tome a dose omitida assim que se lembrar não devendo nunca duplicar as doses.

INDICAÇÃO DE COMO SUSPENDER O TRATAMENTO SE A SUA SUSPENSÃO CAUSAR EFEITOS DE PRIVAÇÃO

Não aplicável.

SOBREDOSAGEM

Não aplicável.

ADVERTÊNCIAS

Aconselha-se o utente a comunicar ao médico ou farmacêutico os efeitos indesejáveis detectados e que não constem neste folheto informativo.

Aconselha-se o utente a verificar o prazo de validade inscrito na embalagem.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO

Não conservar acima de 25°C

Data da última revisão do folheto: Abril 2006.

DISTRIBUÍDO POR

SANÓBIA - Centro de Saúde e Estética, Lda
Rua Joaquim Paço d'Arcos, 11
1500-365 LISBOA

Logotipo SANÓBIA
