

APROVADO EM 01-10-2004 INFARMED

FOLHETO INFORMATIVO

Antibiophilus, 1500 mg, Pó para suspensão oral

Lactobacillus casei variedade rhamnosus

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica.

No entanto, é necessário utilizar Antibiophilus Pó para suspensão oral com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter a necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, solicite os serviços do farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde, consulte o seu médico.

Neste folheto:

- 1) O que é o Antibiophilus[®] Pó para suspensão oral e para que é utilizado.
- 2) Antes de tomar Antibiophilus[®] Pó para suspensão oral.
- 3) Como tomar Antibiophilus[®] Pó para suspensão oral.
- 4) Efeitos secundários possíveis.
- 5) Conservação de Antibiophilus[®] Pó para suspensão oral.
- 6) Outras informações.

A substância activa é Lactobacillus casei variedade rhamnosus titulada no mínimo a 10⁸ germes/g, cada saqueta contém 1,5 g de pó.

APROVADO EM 01-10-2004 INFARMED

Os outros ingredientes são: Amido de batata, Lactose e Extracto seco de leite desnatado.

O Titular da Autorização de Introdução no Mercado do Antibiohilus® Pó para suspensão oral são os Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A.
Estrada Nacional 117-2 2724-503 Amadora.

1. O QUE É ANTIBIOPHILUS® Pó para suspensão oral E PARA QUE É UTILIZADO

Código ATC: A07FA 01 Microorganismos Antidiarreicos - Organismos produtores de ácido láctico

C.F.T. : VII -6 a) Anti-sépticos intestinais

Antibiohilus® Pó para suspensão oral é um medicamento anti-diarreico, de origem microbiana.

Antibiohilus® Pó para suspensão oral é utilizado na prevenção das diarreias induzidas por antibióticos e no tratamento sintomático das diarreias de origem não orgânica.

2. ANTES DE TOMAR ANTIBIOPHILUS® Pó para suspensão oral

Não tome Antibiohilus® Pó para suspensão oral:

- **Se tiver alergia** à substância activa ou a qualquer um dos ingredientes da fórmula.
- **Em casos** de hipersensibilidade à lactose ou ao leite.

Tome especial cuidado com Antibiohilus® Pó para suspensão oral:

- **Se for um indivíduo imunocomprometido**, deve utilizar Antibiohilus cuidadosamente, pois a probabilidade de ocorrerem infecções oportunistas está aumentada ou de ocorrer grandes desequilíbrios no seu aparelho gastrointestinal.

Não há necessidade de ajuste posológico nas crianças, idosos e insuficientes renais ou hepáticos.

Gravidez

Antibiophilus[®] Pó para suspensão oral não é aconselhável durante a gravidez, salvo indicação médica contrária.

Aleitamento

Antibiophilus[®] Pó para suspensão oral não é aconselhável durante o aleitamento, salvo indicação médica contrária.

Condução de veículos e utilização de máquinas:

Até ao momento não se encontram descritos efeitos que afectem esta capacidade.

Informações importantes sobre alguns ingredientes de Antibiophilus[®] Pó para suspensão oral:

Antibiophilus[®] Pó para suspensão oral contém lactose na sua composição. Avise o seu médico se sofre de intolerância à lactose.

Tomar Antibiophilus[®] Pó para suspensão oral **com outros medicamentos:**

Até ao momento não são conhecidas interacções do Antibiophilus com outros medicamentos.

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica.

3. COMO TOMAR Antibiophilus[®] Pó para suspensão oral

Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver a impressão de que **Antibiophilus**[®] Pó para suspensão oral é demasiado forte ou demasiado fraco.

Não altere as doses nem a duração do tratamento a seguir indicados:

A dose habitual de **Antibiophilus**[®] Pó para suspensão oral é:

Na profilaxia de diarreias induzidas por antibióticos: 2 saquetas por dia.

Tratamento sintomático de diarreia de origem não orgânica: 4 a 8 saquetas por dia.

APROVADO EM 01-10-2004 INFARMED

ANTIBIOPHILUS Pó para suspensão oral deve ser administrado diariamente, podendo ser dissolvido em água, sumos ou alimentos.

Complementar este tratamento com bebidas açucaradas e caldos salgados para compensar as perdas em líquido devidas à diarreia.

Se tomar mais Antibiophilus® Pó para suspensão oral **do que deveria:**

Os Lactobacillus são hospedeiros habituais do intestino do Homem e de diferentes espécies animais e não possuem nenhuma toxicidade, confirmada não só pelos múltiplos estudos clínicos, mas também pela farmacovigilância, não tendo sido referido até à data nenhum efeito indesejável desde a sua comercialização.

Caso se tenha esquecido de tomar Antibiophilus® Pó para suspensão oral:

Tome a saqueta logo que se lembrar ou então, deverá ser retomado na próxima toma. Não duplique as doses.

A duração média do tratamento com **Antibiophilus®** Pó para suspensão oral, na situação de prevenção das diarreias, dura até ao final do tratamento do antibiótico. No caso de tratamento sintomático das diarreias pode ser utilizado até ao desaparecimento de sintomas.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

O Lactobacillus casei variedade rhamnosus, pode produzir um aumento da flatulência intestinal (gases), no início da terapêutica. Normalmente este efeito diminui com a continuação do tratamento.

5. CONSERVAÇÃO DE Antibiophilus® Pó para suspensão oral

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Conservar o medicamento na sua embalagem de origem.

Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Não tome **Antibiophilus®** Pó para suspensão oral após expirar o prazo de validade indicado na embalagem.

APROVADO EM 01-10-2004 INFARMED

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do titular da autorização de introdução no mercado.

Se tiver quaisquer outras questões acerca dos seus medicamentos, coloque-as ao seu médico ou farmacêutico.

Este folheto foi revisto pela última vez em **Setembro 2004**.