

FOLHETO INFORMATIVO  
BACIDERMA, Pomada

BACIDERMA sendo uma associação de antibióticos de largo espectro tem efeito benéfico a nível da cicatrização e de determinadas infecções cutâneas.

COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA por 100 g de pomada

Sulfato de neomicina ..... 0,5 g  
Bacitracina de Zinco ..... 25.000 U.I.  
Excipiente q.b.

FORMA FARMACÊUTICA

BACIDERMA apresenta-se em bisnagas de 10 g de pomada.

CATEGORIA FÁRMACO-TERAPÊUTICA

Medicamento de aplicação tópica na pele (etiográfico)

NOME E SEDE DO RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

CONFAR – Consórcio Farmacêutico, Lda  
Rua Félix Correia, 1-B  
1500-271 LISBOA

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

Dermatites infectadas e de difícil cicatrização; foliculites; furúnculos e abscessos.

CONTRA-INDICAÇÕES E FEITOS SECUNDÁRIOS MAIS FREQUENTES

Alergia à bacitracina e à neomicina.

BACIDERMA pode desencadear reacções alérgicas, prurido, “rash” e irritação cutânea.

Nos casos e que se dê agravamento ou persistência dos sintomas deve consultar o médico.

## INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS

Não estão descritas

## PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO

Não utilizar a pomada sobre lesões abertas, sobre as dobras da pele e sobre superfícies extensas.

## EFEITOS EM GRÁVIDAS, LACTENTES, CRIANÇAS, IDOSOS E DOENTES COM PATOLOGIAS ESPECIAIS

Lactentes: BACIDERMA está contra-indicada em infecções mamárias durante o aleitamento, devido ao risco de ingestão do produto por parte do recém-nascido.

Não é de excluir a absorção dos antibióticos pelo que não se recomenda o seu uso principalmente no caso de recém-nascidos.

## EFEITOS SOBRE A CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS E UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS

Não se aplica.

## EXCIPIENTES

L-Cistina, DL-Treonina, Glicina, Álcool cetílico e estearílico, Lanette, parafina, propilenoglicol, metil-parabeno e água desmineralizada.

## POSOLOGIA USUAL

Aplicar uma camada de pomada sobre a lesão, duas a três vezes ao dia.

## MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO

BACIDERMA destina-se exclusivamente para aplicação tópica na pele.

## MOMENTO MAIS FAVORÁVEL À ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO

Sem indicação especial.

## DURAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDIO

Sem indicação especial.

## ATITUDE A TOMAR QUANDO FOR OMITIDA UMA OU MAIS DOSES

Reiniciar o tratamento da forma habitual.

## MEDIDAS A ADOPTAR EM CASO DE SOBREDOSAGEM E/OU INTOXICAÇÃO

Não estão relatados casos de sobredosagem e/ou intoxicação com BACIDERMA.

CASO SE OBSERVEM EFEITOS INDESEJÁVEIS NÃO INDICADOS ESTE FOLHETO, ESTES DEVEM SER COMUNICADOS AO SEU MÉDICO E/OU AO SEU FARMACÊUTICO

VERIFIQUE O PRAZO DE VALIDADE INSCRITO NA EMBALAGEM

CONSERVAR NA EMBALAGEM DE ORIGEM

DATA DA REVISÃO DESTE FOLHETO: