

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Vitaminofalmina A 50000 U.I./g Pomada oftálmica
Retinol, palmitato

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar Vitaminofalmina A com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, após três dias, consulte o seu médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é Vitaminofalmina A e para que é utilizado
2. Antes de utilizar Vitaminofalmina A
3. Como utilizar Vitaminofalmina A
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Vitaminofalmina A
6. Outras informações

1. O QUE É VITAMINOFTALMINA A E PARA QUE É UTILIZADO

A Vitaminofalmina A, pomada oftálmica, doseada a 50 000 U.I./g de palmitato de retinol (vitamina A), para uso oftálmico, pertence ao grupo fármaco-terapêutico 15.6.3 Medicamentos usados em afeções oculares. Outros medicamentos e produtos usados em oftalmologia. Outros medicamentos.

Vitaminofalmina A, pomada oftálmica, está indicada:

- Na hipossecção conjuntival;
- Na irritação ocular de duração inferior a três dias.

2. ANTES DE UTILIZAR VITAMINOFTALMINA A

Não utilize Vitaminofalmina A

-Se tem alergia (hipersensibilidade) ao retinol, palmitato (vitamina A) ou a qualquer outro componente de Vitaminofalmina A.

Ao utilizar Vitaminofalmina A com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

As interações com outros medicamentos são desconhecidas para o uso oftálmico da Vitaminofalmina A (vitamina A).

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
O uso da Vitaminoftalmína A, pomada oftálmica, não está contra-indicado na gravidez e aleitamento.

CRIANÇAS, IDOSOS E DOENTES COM PATOLOGIAS ESPECIAIS: O uso da Vitaminoftalmína A, pomada oftálmica, não está contra-indicado nestes grupos de doentes.

Condução de veículos e utilização de máquinas

A Vitaminoftalmína A, pomada oftálmica não interfere com a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. No caso de ocorrer perturbação da visão, nos momentos que se seguem à aplicação da pomada oftálmica, os doentes não deverão conduzir nem utilizar máquinas enquanto esta persistir.

Informações importantes sobre alguns componentes de Vitaminoftalmína A

Vitaminoftalmína A contém lanolina. Pode causar reações cutâneas locais (por exemplo dermatite de contacto).

3. COMO UTILIZAR VITAMINOFTALMÍNA A

Uso oftálmico.

Utilizar Vitaminoftalmína A sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

A duração do tratamento deve ser determinada pelo médico oftalmologista com base na situação clínica do doente.

Como média, recomenda-se a aplicação de uma pequena quantidade de pomada oftálmica, pelo menos duas a três vezes ao dia.

Quando se obtiver uma resposta favorável, reduzir o número de aplicações para duas vezes ao dia.

Modo de administração

- Aplicar a dose de Vitaminoftalmína A, pomada oftálmica, indicada pelo médico, no fundo do saco conjuntival do(s) olho(s) afetado(s).
- Aquando da primeira aplicação convém rejeitar a pequena porção de pomada em contacto com a tampa.
- Evitar o contacto da bisnaga com o olho.

No caso de persistência ou agravamento dos sintomas dever-se-á consultar um médico.

Se utilizar mais Vitaminoftalmína A do que deveria

Não estão descritos, nem são de prever, casos de sobredosagem.

Caso se tenha esquecido de utilizar Vitaminoftalmína A

Não utilize uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de aplicar.

No caso de se esquecer de uma dose, administre-a assim que se lembrar e, continue o tratamento de acordo com o estabelecido.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, Vitaminoftalmina A pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Não foram observados efeitos secundários da Vitaminoftalmina A em uso oftálmico.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR VITAMINOFTALMINA A

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Embalagem fechada: Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Após a primeira abertura da bisnaga: Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Manter a bisnaga bem fechada.

Conservar na embalagem de origem.

Não use para além de 28 dias depois da primeira abertura da bisnaga.

Após interrupção do tratamento, não deverá guardar a bisnaga com a pomada para posterior utilização.

Não utilize Vitaminoftalmina A após o prazo de validade impresso na bisnaga e na embalagem exterior, após "Validade". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Vitaminoftalmina A

- A substância ativa é o retinol, palmitato (vitamina A). Um grama de vitaminoftalmina A pomada oftálmica contém 50000 U.I. de retinol, palmitato.
- Os outros componentes são: lanolina anidra e vaselina branca.

Qual o aspeto de Vitaminoftalmina A e conteúdo da embalagem

Vitaminoftalmina A apresenta-se sob a forma farmacêutica de pomada oftálmica, acondicionada em bisnaga de alumínio.

APROVADO EM 22-11-2012 INFARMED

Embalagem com uma bisnaga com 5 g de pomada oftálmica.

Titular de Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular de Autorização de Introdução no Mercado

DAVI II - Farmacêutica, S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso, nº 71, Edifício D, 6º andar
Queluz de Baixo - 2730-055 Barcarena
Portugal
Tel: 214 340 000
Fax: 214 340 099
E-mail: geral@davi.pt

Fabricante

Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A. (Fab. Santiago de Besteiros)
Zona Industrial do Lagedo - Santiago de Besteiros
3465-157 Campo de Besteiros
Portugal

Medicamento não sujeito a receita médica

Este folheto foi aprovado pela última vez em