

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Quinodermil As 30 mg/g + 30 mg/g Pomada
Clioquinol + Ácido salicílico

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar Quinodermil As com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas após 14 dias (ou 5 dias em doentes pediátricos), consulte o seu médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é Quinodermil As e para que é utilizado
2. Antes de utilizar Quinodermil As
3. Como utilizar Quinodermil As
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Quinodermil As
6. Outras informações

1. O QUE É Quinodermil As E PARA QUE É UTILIZADO

Grupo farmacoterapêutico: 13.1.2 Medicamentos usados em afecções cutâneas. Anti-infecciosos de aplicação na pele. Antibacterianos.

Quinodermil As é um antibacteriano que está indicado no tratamento de:

- Micoses interdigitais
- Dermatite seborreica
- Hiperqueratoses, incluindo calos e calosidades

2. ANTES DE UTILIZAR Quinodermil As

Não utilize Quinodermil As

- Se tem hipersensibilidade (alergia) às substâncias activas ou a qualquer outro componente de Quinodermil As.
- Em crianças com idade inferior a 2 anos.

Tome especial cuidado com Quinodermil As

Este medicamento não está indicado no tratamento de dermite das fraldas ou crosta láctea do recém-nascido.

Não aplicar se houver lesão aberta (ferida).

Os salicilatos são rapidamente absorvidos pela pele e estão descritos casos de intoxicação por estes fármacos após o seu uso excessivo, pelo que não é aconselhada a utilização por longos períodos, em grandes concentrações, em extensas áreas corporais e na pele inflamada ou com soluções de continuidade e em pensos oclusivos.

Pode ocorrer hipersensibilidade cruzada em indivíduos sensíveis aos compostos iodados ou a derivados das quinonas e hidroquinonas (como os anti-maláricos)”.

Deve ser evitado o contacto com as mucosas.

Este medicamento pode provocar descoloração do cabelo e das unhas.

Podem ocorrer testes falsos positivos em testes urinários de fenilcetonúria e testes para avaliação da função tiróideia.

Utilizar Quinodermil As com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica, contudo, não estão documentadas interações com outros medicamentos.

Diuréticos, Inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina (IECA) e Antagonistas da Angiotensina II (AAII): A aplicação de salicilato (>3g/dia) pode diminuir a eficácia dos diuréticos assim como de outros medicamentos anti-hipertensores. Nalguns doentes com função renal diminuída (ex.º: doentes desidratados ou idosos com comprometimento da função renal) a co-administração de um IECA ou AAI e agentes inibidores da cicloxigenase pode ter como consequência a progressão da deterioração da função renal, incluindo a possibilidade de insuficiência renal aguda, que é normalmente reversível. A ocorrência destas interações deverá ser tida em consideração em doentes a fazer a aplicação de Ácido salicílico, sobretudo se for em zonas extensas da pele e por tempo prolongado, em associação com IECA ou AAI. Consequentemente, esta associação medicamentosa deverá ser utilizada com precaução, sobretudo em doentes idosos. Os doentes devem ser adequadamente hidratados e deverá ser analisada a necessidade de monitorizar a função renal após o início da terapêutica concomitante, e periodicamente desde então.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Dada a possibilidade de ocorrência de absorção sistémica de clioquinol e de ácido salicílico, este medicamento só deverá ser utilizado durante a gravidez ou aleitamento por indicação médica expressa.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não se aplica.

Informações importantes sobre alguns componentes de Quinodermil As

Quinodermil As contém Para-hidroxibenzoato de metilo (E218) e Para-hidroxibenzoato de propilo (E216) os quais podem causar reacções alérgicas (possivelmente retardadas).

3. COMO UTILIZAR Quinodermil As

Uso cutâneo.

Utilizar Quinodermil As sempre de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

A posologia deve ser instituída pelo médico de acordo com as necessidades de cada caso. Aplicar três vezes por dia, até estabilização da situação, passando então a duas vezes por dia.

O tratamento não deve ter duração superior a 2 semanas, excepto em situações devidamente controladas pelo médico.

Se utilizar mais Quinodermil As do que deveria
Não estão descritos casos de sobredosagem.

Caso se tenha esquecido de utilizar Quinodermil As
Não utilize uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de utilizar.

Se parar de utilizar Quinodermil As
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, Quinodermil As pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Pode ocorrer irritação, ardor local e rash cutâneo.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR Quinodermil As

Não conservar acima de 25°C.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize Quinodermil As após o prazo de validade impresso na bisnaga e na embalagem exterior após “VAL.:" (abreviatura utilizada para prazo de validade). O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado

Não utilize Quinodermil As se verificar sinais visíveis de deterioração.

APROVADO EM 16-11-2006 INFARMED

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Quinodermil As

As substâncias activas são o Clioquinol e o Ácido salicílico.

Cada grama de Quinodermil As Pomada, contém 30 mg de Clioquinol e 30 mg de Ácido salicílico.

Os outros componentes são: Vaselina sólida, Lanolina anidra, Para-hidroxibenzoato de metilo (E218) e Para-hidroxibenzoato de propilo (E216).

Qual o aspecto de Quinodermil As e conteúdo da embalagem

Quinodermil As apresenta-se na forma farmacêutica de pomada, com cor creme a amarelada, acondicionada em Bisnaga de Alumínio revestido interiormente com verniz.

Embalagem contendo 1 bisnaga com 25 gramas de pomada.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Laboratório Edol - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Av. 25 de Abril, 6

2795-195 Linda-a-Velha

Portugal

Medicamento Não Sujeito a Receita Médica

Este folheto foi aprovado pela última vez em: